

Raciones de destete precoz y de inicio de altas ganancias

Ejemplos de raciones para diferentes categorías de destetes precoces e inicio de encierres a corral de alta ganancia sin fibra larga.

RACIONES	55 a 80 kg	80 a 150 kg	>150 a 200 (1)
GRANO MAÍZ ENTERO	60%	64%	65%
PELLET GIRASOL	25%	25%	25%
PELLET SOJA	12,5%	8,5%	5%
TERNERO EXTRA	2,5%	2,5%	2,5%
DÍAS DE ALIMENTACIÓN	30 a 40	20 a 30	15 a 20
CONVERSIÓN, (2)	2,8:1	3,5:1	4,5:1
CONSUMO, (3)	2,0	3,0	4,0 a 4,5
GANANCIA DE PESO	0,80	0,85	0,85 a 1,00

(1) Los inicios de alta ganancia pueden realizarse en novillos y vaquillonas de mayor peso. Estimar un consumo promedio de materia seca para la etapa de inicio equivalente al 2,5% del peso vivo y una conversión 5:1.

(2) kg alimento / kg peso ganado.

(3) kg / animal.

(4) kg / animal / día.

Raciones de engorde a corral (feedlot) sin y con fibra larga

Ejemplos de raciones para alimentar a corral sin y con fibra larga (1).

(Por otras raciones consultar al equipo técnico de Biotécnicas Argentina)

RACIONES	Sin fibra larga (2)	Con Silaje	Con Rollo
GRANO MAÍZ ENTERO	72,5%	54,3% 58,3%	73,5% 77,5%
PELLET GIRASOL	25%	14% ---	14% ---
SILAJE	---	30% 30%	---
ROLLO	---	---	10% 10%
PELLET SOJA	---	--- 10%	--- 10%
DASGROW EXTRA	2,5%	---	2,5% 2,5%
BOVINOS EXTRA	---	1,7% 1,7%	---
DÍAS ALIMENTACIÓN (3)	HASTA TERMINAR		
CONVERSIÓN (4) NOVILLITOS 180 A 320 KG	5,5 : 1		
VAQUILLONAS 200 A 320 KG	6 : 1		
NOVILLOS 350 A 480 KG	7,5 : 1		
VACAS	9,5 : 1		
GANANCIA DE PESO (5)	1,2 a 1,5		

(1) Durante el acostumbramiento se debe incluir más rollo o silaje y paulatinamente, en un lapso de tiempo que varía entre 15 a 20 días disminuir paulatinamente la fibra hasta llegar a la ración indicada. Ver acostumbramiento con silaje o rollo.

(2) En raciones sin fibra larga en animales en estado regular o con estrés por transporte iniciar con Terneros Extra. Si los animales están en buen estado iniciar con Dasgrow Extra y continuar hasta terminar o después de un mes utilizar Feedlot 2002 al 2%. Al inicio aumentar el pellet de girasol al 30% y a los 10 días llevar al 25%, pudiéndose bajar hasta el 23% en la ración definitiva.

(3) Los días de encierre en promedio son de 90 días.

(4) kg alimento/kg peso ganado.

(5) kg/animal/día.

Pautas para llevar adelante el acostumbramiento en raciones con fibra larga (rollo o silaje).

Ración seca acostumbramiento:

67% Grano de maíz
30% Pellet girasol
3% Terneros Extra o Bovinos Extra

Acostumbramiento en raciones con silaje

COMPONENTES	DÍA		
	1 al 5	6 al 10	11 al 15
RACIÓN SECA	20%	35%	55%
SILAJE MAÍZ O SORGO (30% MS)	80%	65%	45%

Acostumbramiento en raciones con rollo (*)

COMPONENTES	DÍA 1 al 5	DÍA 6 al 10	DÍA 11 al 15
	RACIÓN SECA	40%	60%
ROLLO	60%	40%	25%

(*) en caso de no contar con moladora de rollo, suministrar el rollo en porta rollo:

Día 1 al 4 acceso al rollo día completo y ofrecer 1,5 a 2 kg de ración seca/an./día repartida en dos veces.

Día 5 al 8 restringir el acceso al rollo medio día y ofrecer 3 a 4 kg de ración seca/an./día repartida en dos veces.

Día 9 al 12 restringir el acceso al rollo a cuarto día y ofrecer 5 a 6 kg ración seca/an./día repartida en dos veces.

Día 13 al 16 restringir el acceso al rollo a cuarto día y ofrecer ración de terminación (ver tabla 2) a comedero lleno.

A partir del día 17, restringir acceso al rollo a 1 o 2 horas, con suficiente cantidad de rollos para que todos los animales tengan acceso para consumir rollo en ese tiempo. Continuar con la ración de terminación a voluntad.

terneros extra



Premezcla Indicada para usar en destetes precoces e inicios de encierres a corral. Permite lograr ganancias de peso altas y adaptación rápida a raciones concentradas, mejorando el resultado económico, porque:

- estimula consumo
- duplica ganancia de peso en etapas de inicio
- mejora conversión del alimento
- estimula defensas
- previene acidosis, timpanismo, coccidiosis, neumonías, querato
- reduce los índices de mortandad
- permite una implementación práctica y fácil de la alimentación a corral.

Dosis: 2,5% en raciones secas.
Presentación: bolsas de 25 kg.

dasgrow extra



Premezcla indicada para usar en engordes a corral. Su fórmula permite que se use sin fibra larga (rollo o silaje).

Previene acidosis, timpanismo y sobreconsumo. Mejora conversión del alimento. Aporta vitaminas A, D y E, minerales y monensina.

Dosis: 2,5% en raciones secas.
Presentación: bolsas de 25 kg.

bovinos extra



Premezcla indicada para usar en engordes a corral que aporten fibra larga (rollo o silaje) en la ración o suplementación a campo. Previene acidosis y timpanismo, estimula el consumo y mejora la conversión del alimento. Aporta vitaminas A, D y E, minerales y lasalocid.

Dosis: 2,5% en raciones secas.
Presentación: bolsas de 25 kg.

feedlot 2002



Premezcla indicada para usar en engordes a corral en animales pesados o novillos livianos para terminar, luego de DASGROW EXTRA o TERNEROS EXTRA.. Su fórmula permite que se use sin fibra larga (rollo o silaje). Previene acidosis, timpanismo y sobreconsumo. Mejora conversión del alimento. Aporta minerales y monensina.

Dosis: 2% en raciones secas.
Presentación: bolsas de 25 kg.

Productos complementarios feedlot

aditivo atb



Antimicrobiano de amplio espectro de uso profiláctico y terapéutico de neumonías y diarreas infecciosas.

Dosis: 3 a 4 kg/ton en raciones secas.
Presentación: bolsas de 20 kg.
No administrar sin consulta previa a su veterinario.

estimulante bgmos



Manano oligosacáridos y beta-glucanos, prebióticos, que actúan como promotores de crecimiento y mejoran la conversión del alimento; y, además, potencian la acción de los antibióticos.

Dosis: 1,5 a 5 kg/ton en raciones secas.
Presentación: bolsas de 20 kg.


Biotécnicas Argentina

Nutrición y Salud Animal

“asistencia técnica en todo el país”

www.biotecnicas.com.ar

nómade comunicación visual - nomadede@gmail.com



alimentación a corral

feedlot

Biotécnicas Argentina

Nutrición y Salud Animal

“La mejor alternativa
para una producción rentable”

