

# Biotécnicas Argentina

Nutrición y Salud Animal

Líder en nutrición y salud animal



FÓRMULAS ABIERTAS

## Plan de Alimentación OVINOS



El plan perfecto que se ajusta a cada etapa de su producción.



Resultados comprobados en: <sup>✓ OVINOS</sup> CARNE <sup>✓ OVINOS</sup> CABAÑA <sup>✓ OVINOS</sup> LANA <sup>✓ OVINOS</sup> LECHE



Balaceado EFICOR



SUSTITUTO LÁCTEO OVINOS Biotécnicas



Concentrado PROTEICO OVINOS



PMX LANARES EXTRA



PMX LANARES ANIÓNICO



Concentrado ANIONICO

### Alternativas de fórmulas y usos

| FÓRMULAS ABIERTAS           | Gestación 1° y 2° tercio |     | Gestación último tercio |     | Lactancia Simple |     | Lactancia Mellicera | Flushing | Borrega |     | Carnero |     | Cordero    | Feedlot Livianos (10 a 40kg) |            | Feedlot Pesados (40 a 70kg) |     |
|-----------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|-----|------------------|-----|---------------------|----------|---------|-----|---------|-----|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----|
| Maíz partido                | 56%                      | 60% | 56%                     | 60% | 55%              | 60% |                     |          | 56%     | 60% | 56%     | 60% |            | 56%                          | 60%        | 61%                         | 70% |
| Cebada                      |                          |     |                         |     |                  |     |                     |          |         |     |         |     |            |                              |            |                             |     |
| Expeller de soja            | 20%                      |     | 20%                     |     | 25%              |     |                     |          | 20%     |     | 20%     |     |            | 20%                          |            | 15%                         |     |
| Afrechillo de trigo         | 20%                      |     | 20%                     |     | 16%              |     |                     |          | 20%     |     | 20%     |     |            | 20%                          |            | 20%                         |     |
| Lanares Extra               | 4%                       |     | 4%                      |     | 4%               |     |                     |          | 4%      |     |         |     |            | 4%                           |            | 4%                          |     |
| Lanares Aniónico            |                          |     |                         |     |                  |     |                     |          |         |     | 4%      |     |            |                              |            |                             |     |
| Concentrado Ovinos          |                          | 40% |                         | 40% |                  | 40% |                     |          |         | 40% |         |     |            |                              |            |                             |     |
| Concentrado Aniónico        |                          |     |                         |     |                  |     |                     |          |         |     |         | 40% |            |                              | 40%        |                             | 30% |
| Forraje Calidad Baja        | X                        | X   |                         |     |                  |     |                     |          |         |     | X       | X   |            | X                            | X          | X                           | X   |
| Forraje Calidad Media       |                          |     | X                       | X   | X                | X   | X                   | X        | X       | X   |         |     | X          |                              |            |                             |     |
| EFICOR                      |                          |     |                         |     |                  |     | X                   | X        |         |     |         |     | 100%       |                              |            |                             |     |
| Consumo total de MS en % PV | 2%                       |     | 3,5%                    |     | 3,9%             |     | 4,2%                | 5,5%     | 4%      |     | 3,5%    |     | 5,5%       | 4,5%                         |            | 3,5%                        |     |
| Ganancia de peso            |                          |     |                         |     |                  |     |                     |          |         |     |         |     | 250 gr/día |                              | 350 gr/día |                             |     |

#### Acostumbramiento

La incorporación de los alimentos citados ya sea como suplemento o como alimentación definitiva, debe iniciarse de la siguiente manera:

- ✓ Primer semana: 0,5 % (0,4 a 0,6 kg.) + Pastoreo ó Rollo.
- ✓ Segunda Semana: 1,2 % del PV (1kg.) + Pastoreo ó Rollo.

✓ **Alimentación Definitiva:** se puede llegar a 2,5 % del PV. + Pastoreo + Rollo.



## Calendario Biotécnicas para un servicio de otoño

| Actividad  | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rev. de carneros                                   | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Refugo de hembras                                  | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tto. Contra piojos                                 | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Limpieza preservicio ojos-periné                   |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Evaluar despezuada                                 |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HPG y posible desparasitación en animales adultos. |      | X    |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |
| Prev de moscas                                     |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |
| Flushing Biotécnicas                               |      |      | A    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Servicio   |      |      | X    | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Triple CLOSTRIDIAL adultos                         |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      |
| Suplementación Preparto                            |      |      |      |      |      |      | B    |      |      |      |      |      |
| Esquila preparto                                   |      |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |
| Parición y lactancia                               |      |      |      |      |      |      |      | B    |      |      |      |      |
| Parición y lactancia melliceras                    |      |      |      |      |      |      |      | A    |      |      |      |      |
| Sustituto Lácteo Corderos                          |      |      |      |      |      |      |      | C    |      |      |      |      |
| Creepfeeding                                       |      |      |      |      |      |      |      | D    |      |      |      |      |
| Señalada y revisión de ubres                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |      |
| Esquila de corderos                                |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Desparasitación de gusanos en corderos.            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |      | X    |
| Triple CLOSTRIDIAL corderos                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | X    | X    |      |
| Destete y venta de cordero liviano                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |
| Feedlot cordero liviano                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | B    |      |
| Feedlot cordero pesado                             | E    |      | X    | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |

● A: Balanceado EFICOR.

● B: Concentrado Ovinos 40% + Maíz.

● C: Sustituto Lácteo Biotécnicas.

● D: Balanceado EFICOR.

● E: Concentrado Ovinos 30% + Maíz.

✓ **Recomendamos incorporar sales Magnesiadas todo el año.**  
(Prelac Mg AP: 1 parte con 4 partes de Sal Gruesa)

### Consultas, Asesoría, Pedidos:

Oficina Central: Parque Industrial Tandil, Calle 8 N° 379  
(7001) Tandil - Buenos Aires - Argentina  
Tel.: + 54 249 438 5150

[www.biotecnicas.com.ar](http://www.biotecnicas.com.ar)

Facebook: BiotecnicasArgentina  
Instagram: biotecnicas\_argentina